

Produse Accesorii ale Padurii - Principalele Specii de Ciuperci

Acest **laborator** prezinta **Produse Accesorii ale Padurii - Principalele Specii de Ciuperci**.

In acest PDF poti vizualiza cuprinsul si bibliografia (daca sunt disponibile) si aproximativ doua pagini din documentul original.

Arhiva completa de pe site contine un fisier, intr-un numar total de **14 pagini**.

Fisierele documentului original au urmatoarele extensii: pdf.

Extras

1. PRINCIPALELE SPECII DE CIUPERCI

- Sbârciogul (ciuciuleți, ciuciulete, pupi) *Morchella esculenta* Pers.

fam. Morchellaceae

Are pălăria ovoidă sau conică, cu diametrul de 3,0 — 6,0 cm și înălțimea de 3,0—8,0 cm, de culoare gălbuie sau roșcat bruna, cu nuanțe mai deschise spre vârf, iar pe suprafață prezintă numeroase alveole adânci, neregulate și sinuoase, căptușite în interior de himeniu și delimitate de creste sterile și groase. Pălăria este goală în interior, iar marginile acesteia sunt concrescute pe piciorul drept, cilindric și îngroșat spre bază, neted sau vălurat, gol în interior, cu diametrul de 2,0—3,0 cm și înălțimea de 3,0—5,0 cm, de culoare albicioasă sau galben deschis. Carnea este albă, casantă, fragedă, cu gust și miros plăcut.

Crește izolat sau în grupuri, pe terenurile nisipoase ale pădurilor luminate sau ale pajiștilor mai umbrite, în mustul zăpezii sau după ploile călduțe de primăvară.

Comestibilă, foarte bună

- Sbârciogul — *Morchella conica* Pers., fam. Morchellaceae

Se caracterizează prin pălăria de formă conică, cu înălțimea de 3,0—7,0 cm și diametrul în partea inferioară de 1,5—3,0 cm, de culoare brun deschis până la negricioasă cu nuanțe brun-gălbui, cu suprafața presărată de alveole profunde, înguste, dispuse în șiruri longitudinale mai mult sau mai puțin paralele, limitate de nervuri groase, unite între ele prin coaste transversale. Marginile pălăriei sunt neregulate și concrescute pe piciorul aproape cilindric, puțin vălurat și uneori subțiat spre bază, cu diametrul de 1,0—1,5 cm și lungimea de 2,0—4,0 cm, de culoare albicioasă sau cu nuanțe gălbui și Gol în interior. Carnea este albă, cu gust și miros plăcut. Crește izolat sau în grupuri prin păduri de rășinoase și cele de amestec, prin pajiști, preferind solurile nisipoase sau argilo-nisipoase, umede.

PRODUSE ACCESORII ALE PĂDURII PRINCIPALELE SPECII DE CIUPERCI

- Sbârciogul gras (ciuciuleți) *Gyromitra esculenta* (Pers.) Fr., fam. Helvellaceae

Are pălăria globuloasă sau diformă, alcătuită din numeroase pliuri lobate ca niște circumvoluțiuni, de culoare bruna-castanie până la brună-negricioasă, cu dimensiuni de 3,0—8,0 cm. În interior este albă și goală. Piciorul gol în interior, cu diametrul de 1,5—3,0 cm și înălțimea până la 8,0 cm este neted sau vălurat, de culoare alb-gălbui, uneori cu nuanțe roșiatice. Carnea este albă, casantă, cu miros și gust plăcut, însă conține o substanță toxică (acid helvellic), datorită căruia este socotită de unii autori, ca fiind FOARTE OTRĂVITOARE, provocând intoxicații de tip faloidian. Crește în grupuri, în păduri de rășinoase, pe lângă trunchiuri de arbori, pe locuri părginite etc.

- Creasta cocoșului (laba ursului, opintici, burete creț) *Ramaria flava* (Fr), fam. Clavariaceae,

Are forma unui arbust cu piciorul cărnos, gros, albicios, de 3,0—5,0 cm, cu numeroase ramuri și rămurele galbene-aurii, lungi, subțiri, fragile, terminate cu câte 2 vârfuri boante, îndreptate în sus, formând un corp rămuros de mărimea unui pumn (6,0—12,0 cm). Carnea este albă, cu un gust plăcut, însă puțin amăru.

Crește în pădurile de rășinoase și de foioase.

- Rămurelele (creasta cocoșului, opintici, bureții verivei, meloșel, togmăgel, bureți creți) *Ramaria botrytis* (Pers.) fam. Clavariaceae

Are forma unui arbust cu un trunchi de 3,0—4,0 cm, cărnos, la început alb, iar apoi gălbui, de pe care se ramifică ramuri de lungimi diferite galben-aurii, cilindrice și drepte, cărnoase, care se divid în rămurele galbene, sau galbene-roșii, scurte, obtuze, îngroșate, îndreptate în sus și terminate cu câte 2—3 vârfuri boante de culoare roz sau roșu purpuriu, alcătuind corpul fructifer asemănător unei conopide, cu mărimi de 6,0-12,0 cm. Carnea este albă, fragedă, succulentă, cu miros plăcut și gust dulce.

Crește prin păduri de rășinoase și de foioase, izolat sau în grupuri.

Documentul complet de 14 pagini îl poți citi dacă îl descarci din Biblioteca.RegieLive.ro

Imagini din documentul complet:

ENDELE ALCANTORAL DE CUPRINE **DRUMULUILE SPECIE DE CUPRINE**

1. Burete negru *Boletus subterreus* (L.) Fr. fam. Boletaceae

Această ciupercă cu dimensiuni mici, cu marginea înălțată în jos și diametrul de 3,0—10,0 cm. Cuticula galben-măslinie până la brun-cărnă, în maturitate este brăzdată cu o rețea verticală-galbenă. Tulpă scurtă, galbenă, de înălțime de cel mult 1,0 cm și gros de 1,5—2,0 cm. Gălbui sau galben-verzui este colorat și rădăcină în rășină. Carnea albă și foarte gălbui și fragilă sub cuticulă este moale și gust dulce.

Crește pe pășunile de rășinoase și de foioase, izolat sau în grupuri.

Apare vara-toamnă.

Comestibil, medicinal.

2. Urmăsoaie sau înalt *Suillus grevillei* (Klotzsch) Fr. fam. Boletaceae

Această ciupercă are 4,0—14,0 cm cu margine puțin înălțată în jos și colorată. Cuticula galben-aurie sau roșie, se îngroșează cu carne. Proeminențele galben-aurii și după ce se răsucesc dintr-o vreme alb-gălbui, care adesea pe picior. Tulpă înălțată sau înaltă, colorată și deosebită. Piciorul înalt de 4,0—12,0 cm și gros de 1,0—2,5 cm. Colorat, puțin înălțat la bază, galben-auriu cu nuanțe roșii. Carnea gălbui sau galben-verzui este tare și prin rășină devine brun-gălbui. Are miros plăcut și gust dulce.

Crește în pășunile de rășinoase. Apare vara-toamnă.

Comestibil, destul de bun, se recomandă ca înainte de prăjire să se îndepărteze cuticula pălăriei care este puțină. Este

3. Pălărie (burete) *Suillus luteus* (L. ex. Fr.) Fr. fam. Boletaceae

Comestibil, destul de bun, se recomandă ca înainte de prăjire să se îndepărteze cuticula pălăriei care este puțină. Este

Această ciupercă are dimensiuni mici, cu marginea înălțată în jos și colorată. Cuticula galben-brună până la roșu-brun, în maturitate este brăzdată cu o rețea verticală-galbenă. Tulpă scurtă, galbenă, de înălțime de cel mult 1,0 cm și gros de 1,5—2,0 cm. Gălbui sau galben-verzui este colorat și rădăcină în rășină. Carnea albă și foarte gălbui și fragilă sub cuticulă este moale și gust dulce.

Crește pe pășunile de rășinoase și de foioase, izolat sau în grupuri.

Apare vara-toamnă.

Comestibil, foarte bun.

ENDELE ALCANTORAL DE CUPRINE **DRUMULUILE SPECIE DE CUPRINE**

4. Pălărie mare *Xeroneurus bellus* (Fr.) Karst. fam. Boletaceae

Această ciupercă are dimensiuni mici, cu marginea înălțată în jos și diametrul de 4,3—12,3 cm. Cuticula gălbui-brună în tinerețe și apoi emolentă și tomentoză, cu adâncitură centrală. Cuticula brună, brun-cărnă este puțin îngroșată pe zona centrală. Tulpă scurtă, înălțată sau înaltă, galbenă, de înălțime de cel mult 1,0 cm și gros de 1,0—4,0 cm. Colorat, puțin înălțat la bază, galben-auriu cu nuanțe roșii. Carnea albă și foarte gălbui și fragilă sub cuticulă este moale și gust dulce.

Crește pe pășunile de rășinoase și de foioase, izolat sau în grupuri.

Apare vara-toamnă.

Comestibil, foarte bun.

5. Pălărie mică *Xeroneurus bellus* (Fr.) Karst. fam. Boletaceae

Această ciupercă are dimensiuni mici, cu marginea înălțată în jos și diametrul de 4,3—12,3 cm. Cuticula gălbui-brună în tinerețe și apoi emolentă și tomentoză, cu adâncitură centrală. Cuticula brună, brun-cărnă este puțin îngroșată pe zona centrală. Tulpă scurtă, înălțată sau înaltă, galbenă, de înălțime de cel mult 1,0 cm și gros de 1,0—4,0 cm. Colorat, puțin înălțat la bază, galben-auriu cu nuanțe roșii. Carnea albă și foarte gălbui și fragilă sub cuticulă este moale și gust dulce.

Crește pe pășunile de rășinoase și de foioase, izolat sau în grupuri.

Apare vara-toamnă.

Comestibil, foarte bun.

6. Pălărie mică *Xeroneurus bellus* (Fr.) Karst. fam. Boletaceae

Această ciupercă are dimensiuni mici, cu marginea înălțată în jos și diametrul de 4,3—12,3 cm. Cuticula gălbui-brună în tinerețe și apoi emolentă și tomentoză, cu adâncitură centrală. Cuticula brună, brun-cărnă este puțin îngroșată pe zona centrală. Tulpă scurtă, înălțată sau înaltă, galbenă, de înălțime de cel mult 1,0 cm și gros de 1,0—4,0 cm. Colorat, puțin înălțat la bază, galben-auriu cu nuanțe roșii. Carnea albă și foarte gălbui și fragilă sub cuticulă este moale și gust dulce.

Crește pe pășunile de rășinoase și de foioase, izolat sau în grupuri.

Apare vara-toamnă.

Comestibil, foarte bun.

ENDELE ALCANTORAL DE CUPRINE **DRUMULUILE SPECIE DE CUPRINE**

7. Măscăruță (burete pălărie) *Boletus perispicus* (Pers.) Karst. fam. Amanitaceae

Această ciupercă are dimensiuni mici, cu marginea înălțată în jos și diametrul de 6,0-10,0 cm, cu o cutică roșie sau roz-roșie, ușor îngroșată la carne. Tulpă scurtă, înălțată sau înaltă, galbenă, de înălțime de cel mult 1,0 cm și gros de 1,0—2,0 cm. Colorat, puțin înălțat la bază, galben-auriu cu nuanțe roșii. Carnea albă și foarte gălbui și fragilă sub cuticulă este moale și gust dulce.

Crește pe pășunile de rășinoase și de foioase, izolat sau în grupuri.

Apare vara-toamnă.

Comestibil, foarte bun.

8. Burete pălărie (burete pălărie) *Amanita pantherina* (DC. ex. Fr.) Karst. fam. Amanitaceae

Această ciupercă are dimensiuni mici, cu marginea înălțată în jos și diametrul de 7,0—11,0 cm, cu o cutică roșie. Cuticula tomentoză, înălțată sau galben-aurie, îngroșată pe zona centrală, prezintă un model alb, îngroșat, concentric și cilindric. Lamelile albe, numeroase și libere. Piciorul înalt de 6,0—12,0 cm și gros de 1,0—2,0 cm este puțin înălțat, ușor îngroșat la bază, galben-auriu cu nuanțe roșii. Carnea albă și foarte gălbui și fragilă sub cuticulă este moale și gust dulce.

Crește pe pășunile de rășinoase și de foioase, izolat sau în grupuri.

Apare vara-toamnă.

Comestibil, foarte bun.

Mai multe detalii se găsesc în [pagina documentului din Biblioteca.RegieLive.ro](http://pagina.documentului.din.Biblioteca.RegieLive.ro)